



# ASTER \* \* \* DIAGNOSTICA

## **CAMPIONI BIOLOGICI**

### **Esame delle urine completo**

Per l'esame completo portare un campione delle prime urine del mattino. Il campione va raccolto scartando il primo getto. E' preferibile utilizzare appositi contenitori monouso in vendita presso le farmacie.

### **Urine delle 24 ore**

La raccolta delle urine va fatta negli appositi recipienti di plastica in vendita presso le farmacie.

La raccolta va iniziata al mattino sino al mattino successivo compresa la notte.

Terminare la raccolta includendo la prima urina del mattino successivo.

La prima urina del mattino di inizio della raccolta va gettata.

### **Citologia urinaria**

- Raccogliere un campione delle seconde urine del mattino in un contenitore sterile;
- E' necessario ripetere tale esame per tre giorni consecutivi e consegnare possibilmente giorno per giorno i contenitori al laboratorio.

### **Esame parassitologico delle feci**

Non fare uso di antibiotici e di disinfettanti nei 5 giorni precedenti l'esame.

Non assumere nei 5 giorni precedenti Carbone Attivo o Bario (Rx Digerente).

Raccogliere il campione la mattina, qualora non fosse possibile conservare il campione in frigo fino alla consegna al laboratorio che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. L'esame andrebbe ripetuto per almeno 3 giorni consecutivi.

### **Ricerca del sangue occulto**

Le feci vanno raccolte con l'apposito contenitore in vendita presso le farmacie.

Con la metodica in uso nel nostro laboratorio non è necessario seguire una dieta priva di carne.

### **Scotch test**

1. Tagliare con le forbici un pezzo di nastro adesivo poco più corto del vetrino fornito dal Laboratorio;
2. Porre il nastro adesivo sull'orifizio anale e comprimere bene, sulla pelle sottostante, con un

### **Aster Diagnostica**

Via delle Costellazioni n. 306 EUR Torino – Tel. 06 5291330 – Sito web: [www.asterdiagnostica.it](http://www.asterdiagnostica.it)



## ASTER \* \* \* DIAGNOSTICA

- abbassalingua (o con il manico di un cucchiaio) per circa 15-20 secondi;
3. Staccare il nastro adesivo ed applicarlo ben steso sul vetrino fornito;
  4. Eseguire il test per tre mattine a giorni alterni e consegnare al laboratorio entro 2-4 ore dalla raccolta;
  5. Lavarsi bene le mani a prelievo ultimato in quanto le uova sono spesso già infettanti.

### **Espettorato**

Raccogliere il materiale tracheo-bronchiale e non quello salivare, in apposito contenitore sterile in vendita in farmacia.